

 POLIAMBULATORIO PRAECILIA	PROCEDURA PER ALDOSTERONE E RENINA	Data prima emissione: Redatta da:
		Rev. n.... del (inserire giorno) Revisionata da:.....

ALDOSTERONE E RENINA

Per la richiesta di aldosterone e/o renina plasmatici è necessario sapere se si vuole conoscere il valore dei suddetti analiti con il prelievo venoso in condizioni di riposo (clinostatismo) oppure dopo movimento (ortostatismo), poiché i livelli di aldosterone e renina nel sangue cambiano al variare delle situazioni in cui si trova il soggetto in esame.

In entrambi i casi :

- il paziente deve essere a digiuno da almeno 8 ore.
- In clinostatismo il prelievo viene effettuato dopo che il paziente è rimasto disteso su un lettino in posizione supina, in una saletta apposita per almeno due ore.
- In ortostatismo, il prelievo ematico viene eseguito dopo una breve passeggiata di circa venti-trenta minuti a passo svelto.

Per il dosaggio degli analiti in clinostatismo è consigliabile prenotare il prelievo domiciliare, per cui si effettua il prelievo a riposo dopo le ore di sonno notturno, senza che il paziente si alzi dal letto, mentre per sottoporsi al prelievo successivo al movimento, può recarsi presso la nostra struttura in un secondo tempo, nella stessa mattinata,