

 <b>POLIAMBULATORIO PRAECILIA</b>	<b>PROCEDURA PER BREATH TEST PER HELICOBACTER PYLORI</b>	Data prima emissione: ..... Redatta da: .....
		Rev. n.... del (inserire giorno) Revisionata da:.....

## BREATH TEST PER HELICOBACTER PYLORI

L'Urea Breath Test rappresenta una metodica non invasiva, di semplice esecuzione che permette di definire la presenza di Helicobacter Pylori, sia nei bambini che negli adulti.

Per la corretta esecuzione del test è necessario che il paziente osservi le seguenti indicazioni:

- nelle 4 settimane precedenti l'esame non assumere nessun tipo di antibiotico o chemioterapico
- nelle 2 settimane precedenti l'esame non assumere farmaci ANTIACIDI E ANTISECRETIVI ( H2 antagonisti e inibitori della pompa protonica) come ad esempio:
  - OMEPRAZOLO
  - LANSOPRAZOLO
  - PANTOPRAZOLO
  - RABEPRAZOLO
  - ESOPREMAZOLO
- Il test viene eseguito a digiuno.
- Non fumare per almeno 12 ore prima dell'esame.

Il test ha una durata di 30 minuti, in questo periodo il paziente deve rimanere in laboratorio senza mangiare, bere e fumare.

Al paziente viene somministrata per via orale una dose di acido citrico e una dose di urea 13c disciolto in H2O (per i quali non sono mai stati riscontrati effetti indesiderati per il paziente)

Il test si esegue sull'espriato soffiando per mezzo di una cannuccia in provette.